alantan lantan lantan lantan lantan l Journalants

Razakiia tchiorna stotchitsu

Vass3R03s526-530



SINA Collection Vassal-Montpellier

0Mtp954

XII 7 A 7 Razabiia tchiorna stotchitsu





ESIGNATION Razakua Cchiorna Stotchutu LOSXI PLANCHE 7 RANG A souche 7 igueur : 2 ORT : (érig) - ½ érig - couché édoncule : (L) M - C illerandage : 1 ate de Véraison: 7.8.73 ate de Maturité: 24.8.73 x + 2 ourriture : 0 RAPPE : G-M-P:L-M C AIE : TG - G - M - P /8XIS disc. - sph. (ell) - ov. obov. - cyl. - fus. OULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - (N) AVEUR : (s)- m - ar - fox - herb. CHARGE : avec pepins - apyrène JUS : inc. / coloré

DESTGNATION: Razakiia tahioma ni
CLOS XII PLANCHE 7 RANG A Souche 7
Vigueur: 4

PORT: éris 2 éris couché
Millerandage: 2

Date de Véraison: 28 7

Date de Haturité: 19.8.75 x

Pourriture: 0 14

GRAPPE: G-G-P: L-N-C

BAIE: TG-G-M-P

disc.-Sph.-ell.-ov.obov.-cyl.-fus.

COULDUR: Bl-Gr-Rs-Rg-N

SAVEUR: S-m-ar-fox-herb.

CHARGE:

\$1 0

\$2 4

avec pépins-apyrène
\$3 4

JUS: inc.-coloré
\$5 2

Ragakina tchiorna DISTONATION : OLOS TEPRINCHE 7 RATE A Southo 7 Vilguour v 15 ICAT : (Frig) - & Srig - couche Hallorendage : O Boto de Véraison : 2-8 Date de Haturaté : 31 - 516 Fourriture 10 16 1641F1 - G - O - F - E - D - O MAN : CG - 6 - R - P 90X 18 abov. - eyl. - fur. The rest of the second of the avec pépins aproènc

Année: 1971

Emplacement XII. 7: A7. Désignation

! !	Nombre ! Total ! d'yeux !	DATES				
1 1		29(3 !				
1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8	4 *	0-629 3-71 (-1)			

Année:
Emplacement III- 747 Désignation / Razakiia tchiorna

!	!	Nombre ! Total ! d'yeux!	DATES!					
i	!		2413	<u> </u>	!		!	
1 1	3	!		!!!	!	!	!	
! 2	3.1			!!!!	į	!	!	
! 3	1 1	2	1 1	1 1	!	!	!	
!	7!	!		Ole 21/4-	3-72×1 (+5	-) i		
! 5	9!	!		!!!!	160	i	!	

Année: 1973

Emplacement ... XII 7 A 7 ... Désignation Razakira tohiorna stotohitsu

!	! Mombre ! Total ! d'yeux	DATES						
!		3.4	16.4	<u>-</u>	1 1	!		
! 1	1 1		1 1	1	!!!!	1		
! 2	! } !	1	!!!!!	!	i i i i	!		
! 3	3	1	1 2 61	1	!!!!	!		
! 4	to !		1 1	066:4.73.	4 1 1	!		
5	:/ / !				! ! !	!		

Razakiia Tchiorna Stotchitsu.

Fertilité taille courte 23, 84, 88
(agan R30 & 15-20 3 3 3 3)

Désignation: Razakia tchiorna Stotchitsu Emplacement: XII 7A 4.3

(A) BOURGEONNEMENT:

Colonne

- 41 épanoui () moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux
- 42 blanc 6 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées (7) en gouttière (8) autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauvos ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

- Calus Fo

Razakija tehioma Stotehitsu

Désignation : Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement ()- sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORATSON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (5.)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo to

Razakia tehiorna stotehitsu

Désignation : Emplacement :

XII 7 A7 A-3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré () - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré D- à raics 2 - vert 3.

vontre coloré D- à raics 8 - vert 9.

52 - vrille : verto 1 - jaune 2 - rouge clair Delabase rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré Plus vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calus 69

Razakia teliorna stotelitsu

Désignation : Emplacement :

XII 7 47 313

FEUILLE ADULTE.

colonne 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 6. Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéoux 7 - duvetoux 8 - cotonnoux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duvetoux 8 - cetonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmonté (5) Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté Surface: unio 1 - onduléo 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 36 -Norvures : Face supérioure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge centièrement rouge 4. 37 -38 -Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3)entièrement rouge 4. Couleur : vert jaune 1) - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autro 5. PETIOLE

- 39 long 1 moyon 2) court 3.
- 39 glabre 4 sétoux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré D particllement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Emplacement: Razakiia tchiorna stotchitsu Désignation: III 7 A 7 3.3

GRAPPE

24 - Grosse D- Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible long 9

25 - A pédonculo horbacó 1 - mi-aoûté (2 - aoûté jusqu'à la promière ramification 3.

25 - Axo de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 5 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5,

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discorde 0 - sphérorde 1 - ellipsorde 2 - ovorde 3 - troncovorde 4 - obcvorde 5 - cylindrorde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant () - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7

29 - A jus incolore (1)- coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - juteuse (7)- molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6:

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident Din peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.

33 - Do séparation facile (égreneuse) ()- difficile 2.

DEHCHIHATION: Razakiia tehiorna statelitsu EMPLACEMENT: XII 7 A 7 1.3 SARMENT DE VIGNE : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). (3). : ramifié (1), peu ramifie (2) Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2). Ecorce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striće (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocues (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuloux (3), saillanus (4). Nocuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8) : uniforme (1), à raies (2), à bendes (3), ou nocude (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3), : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvore

m Désignation: Razakija tehiorna Stort chitsu Origine : Emplacement: XII 7 A7 8 - Angle des nervures (7 - 2 - 3. 9 - L₁/L Ø - 2 - 3. 10 - L2/L Ø -(2) 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 0 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 3 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8) 17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - (3) 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3. 19 - Base nerv. (gar. au dég.) 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L₃ KX L:₃ ① - 2 - 3. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 -(2) - 3. Forme : (4) - 5. Médiane/Base : 6 - 7 - 87

Nº d'ordre :